

L Laitue des vignes

Description semence

Akènes aplatis et elliptiques. La dissémination des graines se fait par le vent (anémochorie).

Descr. plante adulte

Plante à base généralement ligneuse assez ramifiée. Les capitules sont de couleur jaune doré disposés en petites grappes le long des rameaux. Ils portent 4 à 5 fleurons. Elle a la particularité d'avoir des involucre formées de bractées nombreuses et inégales.



Strate

Herbacée

Cycle Biologique

Plante bisannuelle. Elle fleurit de juillet à septembre.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

[CULTURE.PLANTS.PNCHEADERTITLE]

- - Parasitoïde de la mouche de l'olive - Eupelmus confusus
- - Parasitoïde de la mouche de l'olive - Eurytoma martelli

Hiver

Printemps

Été

Automne



Interactions

Parasitoïde

• **Parasitoïde de la mouche de l'olive *Eupelmus confusus***

Saison	☼
Rôle fonctionnel	Proies alternatives pour les larves
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ☆
Références	¹ Lutter naturellement contre la mouche de l'olive. Editions Edisud. 164 pp., Lecomte J, 2015., http://www.edisud.fr/ [...]
Commentaires	Il s'agit d'une plante hôte pour les insectes de la famille des Cynipidae comme <i>Timaspis phoenixopodos</i> , qui provoquent des galles. Celles-ci vont attirer différents hyménoptères parasitoïdes appartenant aux familles Eupelmidae, Eurytomidae, Torymidae et Pteromalidae.

• **Parasitoïde de la mouche de l'olive *Eurytoma martelli***

Saison	☼
Rôle fonctionnel	Proies alternatives pour les larves
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ☆
Références	¹ Lutter naturellement contre la mouche de l'olive. Editions Edisud. 164 pp., Lecomte J, 2015., http://www.edisud.fr/ [...]
Commentaires	Il s'agit d'une plante hôte pour les insectes de la famille des Cynipidae comme <i>Timaspis phoenixopodos</i> , qui provoquent des galles. Celles-ci vont attirer différents hyménoptères parasitoïdes appartenant aux familles Eupelmidae, Eurytomidae, Torymidae et Pteromalidae.



IAE

- **Bande fleurie adjacente à une parcelle cultivée**

Période de floraison

Indice de fiabilité

Références



¹ Lutter naturellement contre la mouche de l'olive. Editions Edisud. 164 pp.,
Lecomte J, 2015., [http://www.edisud.fr/...](http://www.edisud.fr/)

- **Bande fleurie intra-parcellaire**

Période de floraison

Indice de fiabilité

Références



¹ Lutter naturellement contre la mouche de l'olive. Editions Edisud. 164 pp.,
Lecomte J, 2015., [http://www.edisud.fr/...](http://www.edisud.fr/)