

M Micocoulier

Strate

Arborée

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto





Interactions

Autres

• Parasitoïde de la mouche de l'olive *Pnigalio mediterraneus*

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Commentaires



Proies alternatives pour les larves



Ressource supplémentaire



¹ Limitation des populations de ravageurs de l'olivier par le recours à la lutte biologique par conservation. Cahiers Agricultures 15: 449-455., Warlop F, 2006.

² Osservazioni sulla morfo-biologia del Pnigalio mediterraneus Ferr. et Del. (Hym. Eulophidae). Entomophaga 8: 191-198., Viggiani G, 1963.

Il peut se développer au détriment de la mineuse du micocoulier (*Phyllonorycter millierella*).

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto