

## P Parasitoïde de la cécidomyie des fleurs

Inostemma sp. est une micro-hyménoptère parasitoïde des cécidomyies des fleurs du manguier.

### Conditions d'activités optimales

Inostemma sp. attaquerait majoritairement les larves issues de jeunes feuilles en fin d'hiver et en été.  
<sup>1</sup>{/reference}

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto



## “ Références bibliographiques

<sup>1</sup> Bio-écologie et dynamique des populations de cécidomyie des fleurs (*Procontarinia mangiferae*), un ravageur inféodé au manguier (*Mangifera indica*), en vue de développer une lutte intégrée. Biodiversité et Ecologie, Université de la Réunion. 189 pp., Amouroux P, 2013., [https://tel.archives-ouvertes.fr/\[...\]](https://tel.archives-ouvertes.fr/[...])

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

