

P Parasitoïde de puceron

Petit hyménoptère de 1.0 à 1.6 mm. Face jaune, joues brunâtres. Antennes jaunes avec 6 articles. Thorax brun ou noir, pattes jaunes, abdomen jaune.

Conditions d'activités optimales

Facteurs pédoclimatiques favorisant

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto





Régule

• Puceron des épis de céréales *Sitobion avenae*

Saison



Stade de développement

- de l'ennemi : Stades larvaires
- du ravageur : Ensemble du cycle

Mode d'action

Consommation d'une partie des assimilats produits par la plante cultivée

Efficacité

MOYENNE

Indice de fiabilité

☆☆☆☆

Références

¹ [https://www6.inra.fr/\[...\]](https://www6.inra.fr/[...])

Commentaires

Momie noire et oblongue. Cette espèce a une action à la fois parasitaire et prédatrice car elle consomme l'hémolymphe du puceron hôte après l'avoir piqué.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

