

P Pruniers, Amandiers

Strate

Arborée

Cycle Biologique

Floraison précoce (février-mars)

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto





Interactions

Parasitoïde

- **Parasitoïde de la mouche de l'olive *Eupelmus urozonus***

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Commentaires



Proies alternatives pour les larves



Ressource supplémentaire



¹ Limitation des populations de ravageurs de l'olivier par le recours à la lutte biologique par conservation. Cahiers Agricultures 15: 449-455., Warlop F, 2006.

Les mineuses et tordeuses hébergées par ces essences vont pouvoir être elles-mêmes parasitées par *E. urozonus*.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto



IAE

- **Haie bocagère**
Période de floraison
Indice de fiabilité



Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

