

**R** Ray-grass anglais



Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto





## Interactions


### Autres

- **Carabe *Trechus quadristriatus***

Saison	
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

### Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

- **Campagnol terrestre ou Rat taupier *Arvicola terrestris***

Saison	
Rôle fonctionnel	Nocif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★
Références	<sup>1</sup> Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S & Delattre P, 2010., <a href="http://www7.inra.fr/">http://www7.inra.fr/</a> [...]
Commentaires	Cette plante est nocive pour le campagnol, surtout si c'est sa seule source d'alimentation.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto



## IAE

- **Bande enherbée**

Période de floraison

Indice de fiabilité

Références



★ ★ ★ ★

<sup>1</sup> La lutte biologique par conservation et gestion des habitats. Mémoire de fin d'études d'ingénieur ENSAT. 51 p. + annexes., Pezet J, 2006.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

