

**A** Allonger les rotations



## Impacte

### Impact défavorable

- **Nématode à kystes de la betterave** *Heterodera schachtii*

Période de réalisation



Effet(s) indirect(s)

L'allongement de la rotation permet de diminuer naturellement les niveaux de populations dans le sol en l'absence de betterave et de colza. Il est ainsi recommandé d'espacer les cultures multiplicatrices de quatre ans au minimum.

Indice de fiabilité

★★★★☆

Références

<sup>1</sup> <https://www.itbfr.org/>[...]

- **Cécidomyie du chou-fleur** *Contarinia nasturtii*

Période de réalisation

Il ne faut pas mettre plus d'une brassicacée tout les trois ans car c'est la durée de persistance des pupes dans le sol.

Indice de fiabilité

★★★★☆

Références

<sup>1</sup> Les choux à inflorescence : chou-fleur, brocoli et romanesco. CTIFL. 331p., Porteneuve C., Baty-Julien C., Estorgues V., Maitre R., Penguilly D., et al., 2015

- **Atomaire de la betterave** *Atomaria linearis*

Période de réalisation



Effet(s) indirect(s)

Permet de diminuer les populations présentes.

Indice de fiabilité

★★★★☆

Références

<sup>1</sup> <https://www.itbfr.org/>[...]