

A Araignées

Les araignées sont des prédateurs généralistes et, avec les punaises prédatrices, les prédateurs les plus importants au début du printemps. Elles possèdent une grande variété de tactiques pour capturer leurs proies. Par exemple certaines tissent des toiles de soie alors que d'autres chassent à l'affût. Les araignées peuvent être très résistantes au froid leur permettant d'être actives dès le début du printemps et d'exercer une prédation sur les ravageurs dès leur apparition.¹

Les araignées sont très sensibles aux pesticides.²



Régule


• **Forficules** *Forficula auricularia* & *Forficula pubescens*

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Adulte - du ravageur : Adulte
Type trophique	Polyphage
Mode d'action	Prédateur
Efficacité	MODEREE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	¹ Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. 471p, Ricard et al., 2012


• **Petite mineuse du pêcher** *Anarsia linatella*

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Adulte - du ravageur : Stades larvaires
Mode d'action	Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante
Efficacité	MODEREE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	¹ https://digitalcommons.usu.edu/ [...]

• **Puceron cendré du poirier ou puceron mauve du poirier** *Dysaphis pyri*

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Adulte - du ravageur : Tous les stades
Type trophique	Spécialiste
Mode d'action	Consommation d'une partie des assimilats produits par la plante cultivée
Efficacité	MODEREE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	¹ https://www.grab.fr/ [...]
Commentaires	Taux de prédation non connu.

• **Teigne de l'olivier** *Prays oleae*

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Tous les stades - du ravageur : Tous les stades
Efficacité	MODEREE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	¹ https://www.sud-et-bio.com/ [...]

Plantes hôtes

Plante hôte

• **Arbre de Judée** *Cercis siliquastrum*

Saison

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références



Ressource supplémentaire



¹ Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. CTIFL. 471p., Ricard, JM. et al., 2012

Impact des pratiques agricoles

Impact favorable

- **Bande enherbée**

Période de réalisation

Effet(s) direct(s)

Indice de fiabilité

Références



Favorise les araignées

★★★★☆

¹ [https://www.grab.fr/\[...\]](https://www.grab.fr/[...])

- **Bande fleurie**

Période de réalisation

Effet(s) direct(s)

Indice de fiabilité

Références



Favorise les araignées

★★★★☆

¹ [https://www.grab.fr/\[...\]](https://www.grab.fr/[...])

“ Références bibliographiques

¹ [http://www.produire-bio.fr/\[...\]](http://www.produire-bio.fr/[...])

² [https://www.grab.fr/\[...\]](https://www.grab.fr/[...])

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

