

B Belette d'Europe

La belette adulte mesure entre 14 et 30 cm et sa queue mesure 3-13 cm de long. Ce petit carnivore pèse entre 35 et 130 g lorsqu'il est adulte. Sa silhouette est longiligne et son corps est bas sur patte. Son pelage dorsal est brun-roux tandis que le ventral est blanc; elle possède une tache brune sur la joue.¹



Cycle Biologique


La Belette s'accouple en mars-avril et met bas après 35 jours de gestation. Le nombre de petits par portée varie de 2 à 10. il peut y avoir une seconde portée en juillet-août lorsque les proies sont abondantes. Les belettes sont matures sexuellement à l'âge de 3-4 mois. Elles vivent au maximum 3 ans.

Carnivore, elle s'alimente principalement de campagnols qu'elle peut aller chasser jusque dans leurs terriers. Elle est inféodée à la présence des Campagnols.¹



Régule

• **Campagnol terrestre ou Rat taupier** *Arvicola terrestris*

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Adulte ou Imago - du ravageur : Adulte ou Imago
Type trophique	Polyphage
Mode d'action	Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante
Efficacité	MOYENNE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	¹ https://www.reperes-paysans.org/[...] ² https://inpn.mnhn.fr/[...]
Commentaires	Une belette mange une centaine de campagnols par an. Carnivore, elle s'alimente principalement de campagnols qu'elle peut aller chasser jusque dans leurs terriers.



Impact du contexte paysager

Impact favorable

- **Zone boisée**

Saison



Effet(s) direct(s)

Les zones boisées sont un refuge pour les carnivores et les parasites des rongeurs.

Indice de fiabilité

★★★★☆

Références

¹ Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S & Delattre P, 2010., [http://www7.inra.fr/...](http://www7.inra.fr/)

Références bibliographiques

¹ [https://inpn.mnhn.fr/\[...\]](https://inpn.mnhn.fr/[...])