

C Corneille noire

La corbeille mesure de 43 à 46 cm de long avec 92 à 100 cm d'envergure. Son plumage est noir avec reflets violacés sur le dos et les ailes. Ses pattes sont noires également, tout comme son bec qui est très épais. Les œufs sont verdâtres et tachetés de gris-vert.¹

Cycle Biologique

Cet oiseau est sédentaire en France et reste le plus souvent solitaire. Il est omnivore et se nourrit de graines, de légumineuses, d'insectes, de vers, de fruits, de petits rongeurs et même d'œufs d'autres oiseaux. La ponte se fait dès le début du mois d'Avril avec une couvée comportant 5 œufs en moyenne. Il peut exister une autre ponte de remplacement dans l'année si la première a été défectueuse. La couvée dure un vingtain de jours et les oisillons prendront leur envol 35 jours après l'éclosion.

Conditions d'activités optimales

Bien adaptée aux forts écarts de température.



Bernard

DUPONT, Flickr



Dégâts

• **Chou-fleur** *Brassica oleracea botrytis*

Saison



Stade de développement

Symptôme(s)

Dégâts

Indice de fiabilité

Références

Adulte

Arrachent les mottes.

MODERES

★ ★ ☆ ☆

¹ <http://www.bretagne.synagri.com/>[...]

• **Pois chiche** *Cicer arietinum*

Saison



Stade de développement

Organe(s) touché(s)

Symptôme(s)

Dégâts

Indice de fiabilité

Références

Adulte ou Imago

graines et gousses

La corneille s'attaque aux graines de semis, surtout lors de leur germination ainsi qu'aux gousses des légumineuses.

MODERES

★ ★ ☆ ☆

¹ Le pois chiche. CIVAM Gironde., MAILLE E., 2012., <http://civambiogironde.chez-alice.fr/>[...]

² <http://www7.inra.fr/>[...]

Commentaires

perte de rendement non connue



Est régulé par

- **Autour des palombes *Accipiter gentilis***

Saison

Stade de développement

Mode d'action

Efficacité

Indice de fiabilité

Références



- de l'ennemi : Adulte

- du ravageur : Adulte

Prédateur

MODEREE

★☆☆☆

¹ <https://www.oiseaux.net/>[...]

Références bibliographiques

¹ <http://www7.inra.fr/>[...]