C Couvert d'interculture

Mise en place d'un couvert végétal entre deux cultures principales afin de ne pas laisser un sol nu durant la période d'interculture.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Impacte

Impact favorable

- **Limace noire ou horticole** *Arion hortensis*
  Période de réalisation
  Effet(s) direct(s)
  Une végétation très développée durant l'interculture favorise la présence de limaces (leur confère un abri et une source de nourriture, maintien une humidité qui leur est favorable).
  Indice de fiabilité
  ★★☆☆
  Références
  [1] Référence souhaitée

Impact défavorable

- **Nématodes à galles** *Meloidogyne spp.*
  Période de réalisation
  été
  Effet(s) direct(s)
  Privilégier l'utilisation d'engrais verts nématicides ou, au moins, d'engrais verts non hôtes (Sorgho, Phacelie). Des travaux restent à faire pour définir précisément les meilleures plantes nématicides, mais on peut citer le Tagete minuta et les Crotalaire.
  Indice de fiabilité
  ★★★☆
  Références
  [1] http://itab.asso.fr/[...]

  [2] https://aprel.fr/[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité