

D Dactyle pelotonné ou aggloméré

Description semence

Le fruit couleur paille (les glumelles sont collées à la graine) est de taille moyenne (6-7 mm avec arête), légèrement denté, assez allongé, conservant une courte arête courbée, ce qui donne à la graine un aspect de "virgule".¹

Descr. plante adulte

Cette plante mesure entre 20cm et 1m de haut. Elle forme souvent de grosses touffes aux gaines aplaties au stade végétatif. La ligule est grande, translucide, de forme irrégulière. L'inflorescence est en panicule, ramifiée, de couleur vert à violet.

Strate

Herbacée

Type de feuillage

La préfoliation est pliée; les feuilles sont longues, larges, carénées et de couleur vert-bleu.

pH sol

neutre

Cycle Biologique

Graminée pérenne qui fleurit en Avril-Septembre.



Andreas Rockstein,
Flickr

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Carabe - *Trechus quadristriatus*
- - Campagnol terrestre ou Rat taupier - *Arvicola terrestris*
- - Carabe - *Anchomenus dorsalis*
- - Acariens prédateurs - *Typhlodromus pyri*
- - Carabe - *Poecilus cupreus*

Hiver

Printemps

Été

Automne

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité



Interactions

Autres

- **Carabe *Trechus quadristriatus***

Saison	
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

- **Campagnol terrestre ou Rat taupier *Arvicola terrestris***

Saison	
Rôle fonctionnel	Nocif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★
Références	¹ Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S & Delattre P, 2010., http://www7.inra.fr/ [...]
Commentaires	Cette plante est nocive pour le campagnol, surtout si c'est sa seule source de nourriture. Dans la plupart des cas, le caractère appétent ou répulsif des plantes vis-à-vis des campagnols a été constaté dans des conditions particulières (isolement en cage ou en terrarium ; diversité alimentaire faible, etc.)

Prédateur


- **Carabe *Anchomenus dorsalis***

Saison	
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

- **Acariens prédateurs *Typhlodromus pyri***

Saison	
Rôle fonctionnel	Zone refuge
Note dépendance	● ●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

- **Carabe *Poecilus cupreus***

Saison	
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	● ●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés
Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité





IAE

- **Bande enherbée**

Période de floraison

Indice de fiabilité

Références



★☆☆☆

¹ La lutte biologique par conservation et gestion des habitats. Mémoire de fin d'études d'ingénieur ENSAT. 51 p. + annexes., Pezet J, 2006.

“ Références bibliographiques

¹ Dactyle aggloméré., Chambre d'agriculture Midi-Pyrénées, 2012., [http://www.mp.chambagri.fr/\[...\]](http://www.mp.chambagri.fr/[...])