

## H Hyménoptère parasitoïde

Cette petite guêpe parasitoïde, noire aux yeux également noirs, mesure moins d'1 mm.

### Cycle Biologique

Il s'agit d'un agent de biocontrôle, qui pour favoriser son élevage et son implantation sur le terrain a besoin de ressources telles que le miellat, le nectar...<sup>1</sup>



## Régule

### • **Noctuelle du chou** *Mamestra brassicae*

Saison

Stade de développement

Mode d'action

Efficacité

Indice de fiabilité

Références



- de l'ennemi : Stades larvaires

- du ravageur : Oeuf

Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

MODEREE

☆☆☆☆

<sup>1</sup> Les bandes fleuries régulent les ravageurs des cultures maraîchères et favorisent la biodiversité. Recherche Agronomique Suisse 7: 268-275., Luka H, Barloggio G & Pfiffner L, 2016., [http://www.agrarforschungschweiz.ch/\[...\]](http://www.agrarforschungschweiz.ch/[...])

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> Effet de la nourriture sur la longévité de deux hyménoptères parasitoïdes oophages. Bull. mens. Soc. linn. Lyon 71: 118-122., Rohi L, Bourarach K, Chemseddine M & Pintureau B, 2002., <http://www.linneenne-lyon.org/>[...]