

J Jachère ou prairie non entretenue



Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés
Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité



Impacte

Impact favorable

- **Campagnol des champs** *Microtus arvalis*

Période de réalisation



Effet(s) direct(s)

Les prairies non entretenues sont un lieu de refuge et de ressources nutritives pour les campagnols. Si votre parcelle cultivée est proche d'une prairie non entretenue, les risques d'infestations par les rongeurs sont plus élevés.

Indice de fiabilité

★★★★☆

Références

¹ Guide pour la conception de systèmes de production fruitière économes en produits phytopharmaceutiques. GIS Fruits et Ministère de l'agriculture, Paris, 264 p., Laget E, Guadagnini M, Plénet D, Simon S, Assié G, Billote B, Borioli P, Bourgoïn B, Fratantuono M, Guérin A, Hucbourg B, Lemarquand A, Loquet B, Mercadal M, Parveaud C-E, Ramade L, Rames M-H, Ricaud V, Rousselou C, Sagnes J-L & Zavagli F, 2015.

- **Carabe doré** *Carabus auratus*

Période de réalisation



Effet(s) direct(s)

Le carabe doré est favorisé par les zones non cultivées car il possède une longue période larvaire.

Indice de fiabilité

★★★★☆

Références

¹ Döring, T.F., Kromp B., 2003 title=, [http://doi:10.1016/\[...\]](http://doi:10.1016/[...])