

## L Lamier pourpre

### Description semence

Dimensions : 1,0-1,1 x 2,0 mm ;

Couleur : brun moucheté de blanc ;

Forme : semence diédrique sur la face ventrale, convexe sur la face dorsale ;

Ornementation : paroi lisse avec mouchetures, rarement à rides très fines ;

Fruit contenant les graines : akène.<sup>1</sup>

### Description plantule

Cotylédons auriculés ;

Feuilles simples, arrondies, à dents espacées.<sup>1</sup>

### Descr. plante adulte

Hauteur : 10 à 30 cm. Plante pubescente ;

Tiges diffuses, ascendantes, ramifiées en touffe, souvent rouge violet ;

Feuilles opposées arrondies à cordées, longuement pétiolées, crénelées. Nervures très nombreuses, réunies entre elles en réseau, donnant au limbe un aspect très gaufré. Feuilles supérieures à pétiole court et souvent teintées de rouge près de l'inflorescence, rapprochées en pyramide ;

Fleurs purpurines, groupées par 6 à 10 en 3 à 7 pseudo-verticillés étagés et très rapprochés en fin de tige. Fleurs nettement bilabiées avec une lèvre supérieure de 3,5 mm, duvetée et gonflée en demi sphère, et une lèvre inférieure plus longue.<sup>1</sup>

### Strate



Andreas

Rockstein, Flickr

Herbacée

## Cycle Biologique

Plante annuelle.

Floraison: mars-décembre parfois toute l'année.

 Quels agents biologiques favorise-elle ?

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <http://ephytia.inra.fr/>[...]