


 France métropolitaine

 Poireau *Allium porrum*

Le poireau est une plante bisannuelle maraîchère. Quand il est jeune et consommable, le poireau peut être considéré comme une plante en rosette (comme les choux et autres salades). Il a cependant une particularité. Les feuilles sont bien toutes insérées au même niveau et la tige est très courte. Cependant les feuilles sont formées d'une gaine cylindrique blanche (le blanc de poireau) puis au-dessus d'une partie verte. Les feuilles se séparent alors alternativement d'un côté puis de l'autre (feuilles alternes). La partie blanche de feuilles engainantes fait penser à une tige. Cette partie est blanche car elle était enterrée et privée de lumière (étiolée). Le bourgeon se trouve au centre, à la base, au-dessus d'une tige courte, le plateau. La structure est semblable à celle d'un oignon qui ne se serait pas élargi. - La France est le principal pays producteur européen. - La culture a généralement lieu en plein air. La récolte commence 5 à 7 mois après le semis, avant que la hampe florale ne se développe, et s'échelonne en fonction de la demande. - Il existe des variétés de printemps, d'automne et d'hiver. Les fleurs du poireau sont blanches ou carnées, en ombelle globuleuse multiflore très ample. Ses étamines sont saillantes, les 3 intérieures sont à 3 pointes, dont la médiane est 1 fois plus courte que son filet. Les anthères sont rougeâtres



GOEAU H., 2013. Poireau  
(*Allium porrum*).

## Ravageurs

Mineuse des feuilles d'allium  
*Phytomyza gymnostoma*

Mouche de l'oignon  
*Delia antiqua*

Thrips du tabac et de l'oignon  
*Thrips tabaci*

## Ennemis naturels

Braconide parasite  
*Aphaereta minuta*

Staphylin  
*Aleochara bilineata*

Syrphe porte-plume  
*Sphaerophoria scripta*

Chrysope  
*Chrysopa sp*

Chrysope  
*Chrysoperla sp*

Aeolothrips  
*Aeolothrips intermedius*

## Plantes

Melilot  
*Melilotus sp*

Séneçon commun  
*Senecio vulgaris*

Tanaisie commune  
*Tanacetum vulgare*

Chénopode blanc  
*Chenopodium album*

Féverole  
*Vicia faba*

Erable champêtre  
*Acer campestre*

Noisetier  
*Corylus avellana*

Amarante réfléchie  
*Amaranthus retroflexus*

Carotte sauvage  
*Daucus carota*

Coriandre  
*Coriandrum sativum*

Fenouil  
*Foeniculum vulgare*

## IAE

Bande enherbée

Bande fleurie adjacente à une  
parcelle cultivée

Haie bocagère

Jachère fleurie

Patch

## Impacts favorables des pratiques agricoles

Filet insect-proof

Mélange fleuri projet Agath

Mélange fleuri "Viti-Fleur"

Mélange fleuri "Melliflore II"

Mélange fleuri "PBI"

Bande fleurie adaptée à la culture de  
pêcher

