

 France métropolitaine

 Poirier *Pyrus communis*

Arbre fruitier de 4 à 15 m, qui à l'état sauvage se rencontre principalement dans les bois et les haies. Les fleurs sont de couleur blanches avec des anthères d'un rose violet. Les feuilles à limbe ovale, finement dentée sur le bord, a un pétiole aussi long que le limbe. Le fruit, la poire est constituée d'un réceptacle floral, d'un piridion (ovaire infère) et est considérée comme un faux-fruit comme de nombreux fruits de Rosaceae tels la pomme, la nèfle, le coing... Les principaux pays qui cultivent le poirier sont l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France. ,



Michel

POURCHET, Tela Botanica

 Carpopapse des pommes et poires *Cydia pomonella*

 Ennemis naturels

Mésange bleu
Cyanistes caeruleus

Mésange charbonnière
Parus major

Chauves-souris Pipistrelles
Pipistrellus sp.

Parasitoïde du carpopapse
Ascogaster quadridentata

Parasitoïde du carpopapse
Pristomerus vulnerator

Forficules
Forficula auricularia & *Forficula pubescens*

 Plantes

Potentille arbustive
Potentilla fruticosa

Torilis des champs
Torilis arvensis

Achillée millefeuille
Achillea millefolium L.

Noisetier
Corylus avellana

Viorne tin
Viburnum tinus

Micocoulier
Celtis australis

Charme commun
Carpinus betulus

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Viorne lantane
Viburnum lantana

 IAE

Bande fleurie adjacente à une
parcelle cultivée

Haie bocagère

Jachère fleurie

Patch

Prairie fleurie

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Traitement à l'argile

Filets Alt'Carpo

Conduite Solaxe de l'arbre

Pose de nichoirs

Conservation des arbres à cavités

Taille

Mélange fleuri projet Agath

Pose de diffuseurs à phéromones

Pose de gîtes à chauves-souris

Bande fleurie adaptée à la culture de
pêcher

Aspersion

Pose d'abris artificiels

Bande fleurie

 Psylle du poirier *Cacopsylla pyri*

 Ennemis naturels

Forficules
Forficula auricularia & *Forficula pubescens*

 Plantes

Noisetier
Corylus avellana

Viorne tin
Viburnum tinus

Micocoulier
Celtis australis

Charme commun
Carpinus betulus

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

 IAE

Haie bocagère

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Traitement à l'argile

Filets Alt'Carpo

Conduite Solaxe de l'arbre

Pose de nichoirs

Conservation des arbres à cavités

Taille

Mélange fleuri projet Agath

Pose de diffuseurs à phéromones


Pose de gîtes à chauves-souris


Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Aspersion

Pose d'abris artificiels

Bande fleurie

 Anthonome d'hiver du poirier *Anthonomus pyri*

 Ennemis naturels

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Plantes

Pas de correspondance en BD à ce jour

 IAE

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Traitement à l'argile

Filets Alt'Carpo

Conduite Solaxe de l'arbre

Pose de nichoirs

Conservation des arbres à cavités

Taille

Mélange fleuri projet Agath

Pose de diffuseurs à phéromones

Pose de gîtes à chauves-souris

Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Aspersion

Pose d'abris artificiels

Bande fleurie