

 France métropolitaine

 Tournesol *Helianthus annuus*


Originaire d'Amérique du Nord, le tournesol a été introduit en Espagne par les premiers explorateurs espagnols (au XVI<sup>e</sup> siècle, il était couramment présent dans les jardins comme espèce ornementale). Puis il a peu à peu gagné le reste de l'Europe en tant que plante de grandes cultures pour la production d'huile. Le tournesol a ainsi été cultivé en Russie vers la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. Les premières populations de tournesols d'origine Russe ont ensuite été introduites en France dans les années 60. Les variétés hybrides seront développées dans les années 70 suite à la découverte de la première stérilité mâle cytoplasmique par Leclercq et grâce aux gènes de restauration identifiés par Kinman aux États-Unis.


Cette astéracée est une plante annuelle de taille variable selon les variétés (1 à 2 mètres en moyenne pour les variétés cultivées). Elle développe une racine de type pivot accompagnée d'un réseau de racines secondaires qui prend naissance en dessous du collet. Les fleurs sont groupées en capitules composés de fleurs ligulées en périphérie (jaunes) et de fleurons (ou fleurs tubulées) au centre. Ces derniers fructifieront en akènes. Quant aux feuilles, les cinq premières paires sont généralement opposées et les suivantes alternées. On observe en moyenne de 20 à 40 feuilles chez les hybrides.

Débouchés : L'huile extraite des akènes vise des usages alimentaires et industriels, le tourteau est consommé par l'alimentation animale. Les graines peuvent également être utilisées en oisellerie, un marché de niche pour des variétés striées.



CC-BY-SA C Gibert, Solagro.  
Inflorescence de tournesol  
(*Helianthus annuus*).

 Limace noire ou horticole *Arion hortensis*

 Ennemis naturels

Pigeon ramier  
*Columba palumbus*

 Plantes

Pas de correspondance en BD à ce jour

 IAE

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Semis précoce

Fauche tardive


Mélange fleuri projet Agath

Mélange fleuri "Viti-Fleur"

Mélange fleuri "Melliflore II"

Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Bande fleurie

 Pigeon ramier *Columba palumbus*

 Ennemis naturels

Pigeon ramier  
*Columba palumbus*

Autour des palombes  
*Accipiter gentilis*

Faucon pèlerin  
*Falco peregrinus*

 Plantes

Chêne vert  
*Quercus ilex*

 IAE

Haie bocagère

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Semis précoce

Fauche tardive

Mélange fleuri projet Agath

Mélange fleuri "Viti-Fleur"

Mélange fleuri "Melliflore II"

Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Bande fleurie

 Puceron vert du prunier *Brachycaudus helichrysi*

 Ennemis naturels

Coccinelle à 7 points  
*Coccinella septempunctata*

Syrphe ceinture  
*Episyrphus balteatus*

Chrysope verte commune  
*Chrysoperla carnea*

 Plantes

Charme commun  
*Carpinus betulus*

Féverole  
*Vicia faba*

Erable champêtre  
*Acer campestre*

Ortie dioïque  
*Urtica dioica*

Lierre  
*Hedera helix*

Ammi élevé  
*Ammi majus*

Tanaisie commune  
*Tanacetum vulgare*

Moutarde des champs  
*Sinapsis arvensis*

Achillée millefeuille  
*Achillea millefolium L.*

Coquelicot  
*Papaver rhoeas*

Pomacées  
*Malus spp.*

Carotte sauvage  
*Daucus carota*

Amarante réfléchie  
*Amaranthus retroflexus*

Séneçon commun  
*Senecio vulgaris*

Noisetier  
*Corylus avellana*

Cerfeuil  
*Anthriscus cerefolium*

Bleuet  
*Centaurea cyanus*

 IAE

Bande enherbée

Haie bocagère

Prairie fleurie

Patch

Jachère fleurie

Bande fleurie adjacente à une  
parcelle cultivée

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Semis précoce

Fauche tardive

Mélange fleuri projet Agath

Mélange fleuri "Viti-Fleur"

Mélange fleuri "Melliflore II"

Bande fleurie adaptée à la culture de  
pêcher

