

 France métropolitaine

 Haricot *Phaseolus vulgaris*

On distingue les haricots grimpants et les haricots nains.  
Les feuilles vertes et pourpres sont pétiolées, alternes et composées trifoliées. Les folioles ont une forme ovale presque losangée et font 6 à 15 cm de long sur 3 à 11 cm de large.  
Les fleurs ont une corolle papilionacée qui varie du blanc au rouge.  
Les fruits sont des gousses plus ou moins aplaties selon la variété.



 Jamain,  
Wikimedia commons

 Nématode des tiges et bulbes *Ditylenchus dipsaci*

 Ennemis naturels

Acarien des racines  
*Rhizoglyphus echinopus*

 Plantes

Pas de correspondance en BD à ce jour

 IAE

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Cultures associées

Semis précoce

Rotation

Mélange fleuri projet Agath

Mélange fleuri "Viti-Fleur"

Mélange fleuri "Melliflore II"

Pose de perchoirs

Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Bande fleurie

 Noctuelle de la tomate *Helicoverpa armigera*

 Ennemis naturels

Telenomus sp.  
*Telenomus sp.*

Trichogrammes sp.  
*Trichogramma sp.*

Chrysope verte commune  
*Chrysoperla carnea*

Coccinelle à 7 points  
*Coccinella septempunctata*

Poules  
*Gallus gallus domesticus*

 Plantes

Noisetier  
*Corylus avellana*

Tanaisie commune  
*Tanacetum vulgare*

Moutarde des champs  
*Sinapsis arvensis*

Erable champêtre  
*Acer campestre*

Phacélie à feuilles de tanaisie  
*Phacelia tanacetifolia*

Sarrasin  
*Fagopyrum esculentum*

Aneth  
*Anethum graveolens*

Séneçon commun  
*Senecio vulgaris*

Pomacées  
*Malus spp.*

Amarante réfléchie  
*Amaranthus retroflexus*

Carotte sauvage  
*Daucus carota*

Lierre  
*Hedera helix*

Charme commun  
*Carpinus betulus*

Ammi élevé  
*Ammi majus*

Féverole  
*Vicia faba*

Ortie dioïque  
*Urtica dioica*

Achillée millefeuille  
*Achillea millefolium L.*

 IAE

Bande enherbée

Haie bocagère

Patch

Jachère fleurie

Bande fleurie adjacente à une  
parcelle cultivée

Prairie fleurie

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Cultures associées

Semis précoce

Rotation

 Puceron vert du pois *Acyrtosiphon pisum*

 Ennemis naturels

Coccinelle à 7 points  
*Coccinella septempunctata*

 Plantes

Tanaisie commune  
*Tanacetum vulgare*

Moutarde des champs  
*Sinapsis arvensis*

Erable champêtre  
*Acer campestre*

Lierre  
*Hedera helix*

Charme commun  
*Carpinus betulus*

Ammi élevé  
*Ammi majus*

Féverole  
*Vicia faba*

Ortie dioïque  
*Urtica dioica*

Achillée millefeuille  
*Achillea millefolium L.*

 IAE

Bande enherbée

Haie bocagère

Patch

Jachère fleurie

Bande fleurie adjacente à une  
parcelle cultivée

Prairie fleurie

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Cultures associées

Semis précoce

Rotation

Mélange fleuri projet Agath

Mélange fleuri "Viti-Fleur"

Mélange fleuri "Melliflore II"

Pose de perchoirs

Bande fleurie adaptée à la culture de  
pêcher

Bande fleurie