

 France métropolitaine

 Poirier *Pyrus communis*

Arbre fruitier de 4 à 15 m, qui à l'état sauvage se rencontre principalement dans les bois et les haies. Les fleurs sont de couleur blanches avec des anthères d'un rose violet. Les feuilles à limbe ovale, finement dentée sur le bord, a un pétiole aussi long que le limbe. Le fruit, la poire est constituée d'un réceptacle floral, d'un piridion (ovaire infère) et est considérée comme un faux-fruit comme de nombreux fruits de Rosaceae tels la pomme, la nèfle, le coing... Les principaux pays qui cultivent le poirier sont l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France. ,



Michel

POURCHET, Tela Botanica

 Carpopapse des pommes et poires *Cydia pomonella*

 Ennemis naturels

Mésange bleu  
*Cyanistes caeruleus*

Mésange charbonnière  
*Parus major*

Chauves-souris Pipistrelles  
*Pipistrellus sp.*

Parasitoïde du carpopapse  
*Ascogaster quadridentata*

Parasitoïde du carpopapse  
*Pristomerus vulnerator*

Forficules  
*Forficula auricularia* & *Forficula pubescens*

 Plantes

Potentille arbustive  
*Potentilla fruticosa*

Torilis des champs  
*Torilis arvensis*

Achillée millefeuille  
*Achillea millefolium L.*

Noisetier  
*Corylus avellana*

Viorne tin  
*Viburnum tinus*

Micocoulier  
*Celtis australis*

Charme commun  
*Carpinus betulus*

Cornouiller sanguin  
*Cornus sanguinea*

Viorne lantane  
*Viburnum lantana*

 IAE

Bande fleurie adjacente à une  
parcelle cultivée

Haie bocagère

Jachère fleurie

Patch

Prairie fleurie

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Traitement à l'argile

Filets Alt'Carpo

Conduite Solaxe de l'arbre

Pose de nichoirs

Conservation des arbres à cavités

Taille

Mélange fleuri projet Agath

Pose de diffuseurs à phéromones

Pose de gîtes à chauves-souris

Bande fleurie adaptée à la culture de  
pêcher

Aspersion

Pose d'abris artificiels

Bande fleurie

 Psylle du poirier *Cacopsylla pyri*

 Ennemis naturels

Forficules  
*Forficula auricularia* & *Forficula pubescens*

 Plantes

Noisetier  
*Corylus avellana*

Viorne tin  
*Viburnum tinus*

Micocoulier  
*Celtis australis*

Charme commun  
*Carpinus betulus*

Cornouiller sanguin  
*Cornus sanguinea*

 IAE

Haie bocagère

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Traitement à l'argile

Filets Alt'Carpo

Conduite Solaxe de l'arbre

Pose de nichoirs

Conservation des arbres à cavités

Taille

Mélange fleuri projet Agath

Pose de diffuseurs à phéromones


Pose de gîtes à chauves-souris


Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Aspersion

Pose d'abris artificiels

Bande fleurie

 Anthonome d'hiver du poirier *Anthonomus pyri*

 Ennemis naturels

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Plantes

Pas de correspondance en BD à ce jour

 IAE

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Traitement à l'argile

Filets Alt'Carpo

Conduite Solaxe de l'arbre

Pose de nichoirs

Conservation des arbres à cavités

Taille

Mélange fleuri projet Agath

Pose de diffuseurs à phéromones

Pose de gîtes à chauves-souris

Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Aspersion

Pose d'abris artificiels

Bande fleurie