

## M Méliot blanc

### Origine

Europe - Asie

### Description semence

Les graines sont ovales et jaunes, de 2 mm de long.<sup>1</sup>

### Descr. plante adulte

Plante très mellifère de 30 cm à 2 m de haut, avec des fleurs blanches et un enracinement très profond.

### Strate

Herbacée

### Type de feuillage

Feuille trifoliée

### Cycle Biologique

Plante bisannuelle. Floraison entre Juillet et Octobre.

### Rapidité de croissance

élevée



Andreas

Rockstein, Flickr

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Campagnol des champs - *Microtus arvalis*
- - Campagnol provençal - *Microtus duodecimcostatus*
- - Campagnol souterrain - *Microtus subterraneus*
- - Campagnol terrestre ou Rat taupier - *Arvicola terrestris*
- - Mineuse du pois chiche - *Liriomyza cicerina*

*Hiver*

*Printemps*


*Été*

*Automne*



 Interactions

## Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante


 • **Campagnol des champs *Microtus arvalis***

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	<sup>1</sup> Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S & Delattre P, 2010., <a href="http://www7.inra.fr/">http://www7.inra.fr/</a> [...]


 • **Campagnol provençal *Microtus duodecimcostatus***

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	<sup>1</sup> Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S., Delattre P, 2010., <a href="http://www7.inra.fr/">http://www7.inra.fr/</a> [...]

 • **Campagnol souterrain *Microtus subterraneus***

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	<sup>1</sup> Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S., Delattre P, 2010., <a href="http://www7.inra.fr/">http://www7.inra.fr/</a> [...]

 • **Campagnol terrestre ou Rat taupier *Arvicola terrestris***

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	<sup>1</sup> Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S., Delattre P, 2010., <a href="http://www7.inra.fr/">http://www7.inra.fr/</a> [...]

## • **Mineuse du pois chiche** *Liriomyza cicerina*


Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Abri et ressources nutritives 

● ●

Risque fort concernant l'hébergement des ravageurs

★★★★☆

<sup>1</sup> Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa einschliesslich des Mittelmeerbeckens und der Kanarischen Inseln. , Hering EM, 1957.

<sup>2</sup> <http://www.cabi.org/>[...]

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <http://www.tela-botanica.org/>[...]

## Galerie



Reproduction interdite