

M Méliot blanc

Origine

Europe - Asie

Description semence

Les graines sont ovales et jaunes, de 2 mm de long.¹

Descr. plante adulte

Plante très mellifère de 30 cm à 2 m de haut, avec des fleurs blanches et un enracinement très profond.

Strate

Herbacée

Type de feuillage

Feuille trifoliée

Cycle Biologique

Plante bisannuelle. Floraison entre Juillet et Octobre.

Rapidité de croissance

élevée



Andreas

Rockstein, Flickr

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Campagnol des champs - *Microtus arvalis*
- - Campagnol provençal - *Microtus duodecimcostatus*
- - Campagnol souterrain - *Microtus subterraneus*
- - Campagnol terrestre ou Rat taupier - *Arvicola terrestris*
- - Mineuse du pois chiche - *Liriomyza cicerina*

Hiver

Printemps

Été

Automne

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés


Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité




Interactions

Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante


• Campagnol des champs *Microtus arvalis*

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	¹ Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S & Delattre P, 2010., http://www7.inra.fr/ [...]


• Campagnol provençal *Microtus duodecimcostatus*

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	¹ Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S., Delattre P, 2010., http://www7.inra.fr/ [...]

• Campagnol souterrain *Microtus subterraneus*

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	¹ Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S., Delattre P, 2010., http://www7.inra.fr/ [...]

• Campagnol terrestre ou Rat taupier *Arvicola terrestris*

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	¹ Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S., Delattre P, 2010., http://www7.inra.fr/ [...]

• **Mineuse du pois chiche** *Liriomyza cicerina*


Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Abri et ressources nutritives 

● ●

Risque fort concernant l'hébergement des ravageurs

★★★★☆

¹ Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa einschliesslich des Mittelmeerbeckens und der Kanarischen Inseln. , Hering EM, 1957.

² <http://www.cabi.org/>[...]

Références bibliographiques

¹ <http://www.tela-botanica.org/>[...]

 Galerie



Reproduction interdite