

## P Parasitoïde d'eudémis et cochylis

Il s'agit d'un parasitoïde solitaire. Eudémis et Cochylis sont ses deux principaux hôtes. Il mesure 5 à 6 mm de long, se reconnaît à son corps entièrement noir excepté les fémurs et tibias qui sont brun-rouge. <sup>1</sup>


### Cycle Biologique

Il est capable de s'attaquer à toutes les générations. La femelle pond dans les chenilles de deuxième à quatrième stades larvaires et la larve quitte son hôte avant ou après sa nymphose. Elle tisse alors un cocon blanc dont l'adulte émerge environ une semaine après en été.




## Régule

### • Cochylis de la vigne *Eupoecila ambiguella*

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Ensemble du cycle - du ravageur : Stades larvaires
Mode d'action	Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante
Efficacité	MOYENNE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	<sup>1</sup> La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp., Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011., <a href="http://www.lagalerieverte.com/">http://www.lagalerieverte.com/</a> [...]

### • Eudémis de la vigne *Lobesia botrana*

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Ensemble du cycle - du ravageur : Stades larvaires
Type trophique	Polyphage
Mode d'action	Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante
Efficacité	MOYENNE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	<sup>1</sup> La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp., Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011., <a href="http://www.lagalerieverte.com/">http://www.lagalerieverte.com/</a> [...]

## “ Références bibliographiques

<sup>1</sup> La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp., Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011., <http://lagalerieverte.com/>[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

