

P Parasitoïde de puceron



Régule

• **Puceron cendré du pommier *Dysaphis plantaginea***

Saison



Stade de développement

- de l'ennemi : ponte (hôte)
- du ravageur : Tous les stades

Type trophique

Spécialiste

Mode d'action

Réduction du taux d'assimilation nette qui réduit la quantité d'assimilats produits par la plante cultivée, en réduisant la phot

Efficacité

MODEREE

Indice de fiabilité

☆☆☆☆

Références

¹ [https://www.tandfonline.com/\[...\]](https://www.tandfonline.com/[...])

Plantes hôtes

Abri et ressources nutritives

• **Aubépine** *Crataegus monogyna*

Saison

Note dépendance



Ressource supplémentaire

Indice de fiabilité



Références

¹ Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Edition Duong-Minh Nguyen, Ctifl., Ricard J-M, Garcin A, Jay M, Mandrin J-F, 2012.

• **Canne de Provence** *Arundo donax*

Saison

Note dépendance



Ressource supplémentaire

Indice de fiabilité



Références

¹ Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Edition Duong-Minh Nguyen, Ctifl., Ricard J-M, Garcin A, Jay M, Mandrin J-F, 2012.

• **Lierre** *Hedera helix*

Saison

Note dépendance



Ressource supplémentaire

Indice de fiabilité



Références

¹ Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Edition Duong-Minh Nguyen, Ctifl., Ricard J-M, Garcin A, Jay M, Mandrin J-F, 2012.