P Parasitoïde du charançon des siliques

La tête et le thorax de l'adulte sont de couleur bronze.
La larve possède des dents. [1]

Cycle Biologique

Il y a cinq stades larvaires, la larve passe l'hiver dans la pupe de son hôte.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

Régule

- **Charançon des siliques** ***Ceutorhynchus assimilis***

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Stades larvaires - du ravageur : Stades larvaires
Type trophique	Spécialiste
Mode d'action	Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante
Efficacité	MOYENNE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	[1] Parasitoïds of Oilseed Rape Pests in Europe: Key species for Conservation Biocontrol, inBiocontrol-based integrated Management of oilseed rape pests. 461pp. Edition: Williams IH, Ulber B, Williamns IH, Klukowski Z, Luik A & Nilsson C, 2010.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

Références bibliographiques

[1] Studies of the Stenomalina group, Grahom V & Claridge M F.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité