

P Piégeage sexuel



Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés
Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité



 **Impacte**

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés
Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité



Impact défavorable

- **Noctuelle du chou** *Mamestra brassicae*

Période de réalisation

mai-juin



Effet(s) direct(s)

Le diffuseur propage des phéromones sexuelles spécifiques l'espèce ciblée pour attirer les mâles adultes dans le piège.

Indice de fiabilité

★★☆☆

Références

¹ [http://ephytia.inra.fr/\[...\]](http://ephytia.inra.fr/[...])

Autre

- **Mouche méditerranéenne des fruits** *Ceratitis capitata*

Période de réalisation

Printemps



Effet(s) direct(s)

Évaluation du risque par piégeage des mâles

Indice de fiabilité

★★★★

Références

¹ Protection intégrée des fruits à noyau. CTIFL. 272p., Lichou J., et al., 2001

- **Petite mineuse du pêcher** *Anarsia linatella*

Période de réalisation

Printemps



Effet(s) direct(s)

Permet de déduire les périodes de ponte et le seuil d'intervention.

Indice de fiabilité

★★★★

Références

¹ Protection intégrée des fruits à noyau. CTIFL. 272p., Lichou J., et al., 2001

- **Sésamie ou noctuelle du maïs** *Sesamia nonagrioides*

Période de réalisation

printemps



Effet(s) direct(s)

Suivi des populations

Indice de fiabilité

★★☆☆

Références

¹ [https://www.arvalis-infos.fr/\[...\]](https://www.arvalis-infos.fr/[...])