

R Ray-grass anglais

Strate

Herbacée



Arthur

Chapman, Flickr

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Carabe - *Trechus quadristriatus*
- - Campagnol terrestre ou Rat taupier - *Arvicola terrestris*
- - Punaise prédatrice - *Anthocoris nemoralis*

Hiver

Printemps

Été

Automne



Interactions


Autres

- **Carabe *Trechus quadristriatus***

| | |
|---------------------|---|
| Saison |  |
| Rôle fonctionnel | Site d'hivernage |
| Note dépendance | ● ● ● |
| | Ressource supplémentaire |
| Indice de fiabilité | ★ ★ ★ ★ |


Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

- **Campagnol terrestre ou Rat taupier *Arvicola terrestris***

| | |
|---------------------|--|
| Saison |  |
| Rôle fonctionnel | Nocif |
| Note dépendance | ● |
| | Répulsif |
| Indice de fiabilité | ★ ★ ★ ★ |
| Références | ¹ Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S & Delattre P, 2010., http://www7.inra.fr/ [...] |
| Commentaires | Cette plante est nocive pour le campagnol, surtout si c'est sa seule source d'alimentation. |

Prédateur

- **Punaise prédatrice *Anthocoris nemoralis***

| | |
|---------------------|--|
| Saison |  |
| Rôle fonctionnel | Abri et ressources nutritives |
| Note dépendance | ● ● ● |
| | Ressource supplémentaire |
| Indice de fiabilité | ★ ★ ★ ★ |
| Références | ¹ Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. CTIFL. 471p., Ricard, JM. et al., 2012 |



IAE

- **Bande enherbée**

Période de floraison

Indice de fiabilité

Références



★☆☆☆

¹ La lutte biologique par conservation et gestion des habitats. Mémoire de fin d'études d'ingénieur ENSAT. 51 p. + annexes., Pezet J, 2006.