

R Riz

Cette céréale constitue l'aliment de base pour plus de la moitié de la population mondiale. En Asie, le riz et ses dérivés assurent 60 à 70% des apports énergétiques pour plus de 2 milliards de personnes. En Afrique, il représente la source alimentaire en plus forte croissance et revêt une importance manifeste en matière de sécurité alimentaire dans un nombre croissant de pays à faible revenu¹.

Cultivé sur **164 millions d'hectares** répartis dans **122 pays**, la production mondiale atteint **738 millions de tonnes** en 2015 avec un rendement moyen de **4,6 t/ha**²

En Europe, les conditions climatiques limitent les surfaces rizicoles à 450 000 ha (0,4% de la superficie mondiale), cultivées dans quelques pays du pourtour méditerranéen. L'Italie (230 000 ha) et l'Espagne (120 000 ha) sont les principaux pays producteurs alors que la Grèce, le Portugal et la France cultivent en moyenne 20 000 ha chacun.¹

La forme sauvage *Oryza rufipogon*, originaire d'Asie et âgée d'au moins 7 millions d'années, aurait évolué différemment de part et d'autre de l'Himalaya au cours du temps avant d'être domestiquée en Chine depuis ~10 000 ans.

Au sud de la chaîne himalayenne, c'est une forme de riz à grains longs et fins adapté au climat chaud et au milieu aquatique qui donne naissance à la sous-espèce *Oryza sativa indica*. Du côté chinois, se développe une autre sous-espèce, *Oryza sativa japonica* qui présente des grains ronds et qui est adaptée au climat tempéré¹. Ce sont les 2 sous-espèces que l'on cultive aujourd'hui dans les différentes régions rizicoles de la planète³



Planche botanique du riz (domaine public, Köhler, 1807). Un spécimen en fleurs de la plante (var. *melanoceras* Alef.), partie inférieure. Panicule de fleur B. C Panicule fructifère de la variété *italica* Körnicke. D Branche fructifère de la variété *Sundanensis* Körnicke. 1 un épillet de A ; 2 idem en coupe longitudinale ; 3 étamines ; 4 épillets plus élargis après ablation de la glume inférieure (la plus grande) et d'une feuille de périgone ; 5 endosperme avec plantule de C ; 6 pseudofruits de C en coupe longitudinale ; 7 fruits de D ; 8 idem en section transversale. A, B, C, D de taille légèrement réduite ; 1 à 7 agrandis.

Une deuxième espèce, *Oryza glaberrima* Steud, originaire de l'Afrique de l'Ouest, plus rustique mais moins productive qu'*Oryza sativa*, est cultivée en Guinée et au Sénégal.

Les croisements naturels d'*Oryza sativa* avec des formes sauvages, et les croisements intra-sativa combinés à la sélection naturelle et humaine, ont abouti à la caractérisation de 150 000 variétés, dont une grande partie est conservée dans les banques de gènes à l'International Rice Research Institute (IRRI; Philippines).

Ces différentes variétés de riz cultivé se caractérisent par le format du grain (rond, demi-long, long et très long), sa couleur (brun, rouge ou noir) et son arôme (basmati, thaï, jasmin). toutes, ont en commun, une haute teneur en glucides (77 g en moyenne sur 100 g de riz), sont dépourvus en gluten, riches en fibres, minéraux (magnésium, fer, zinc, potassium), vitamines E et B et des acides aminés essentiels.

Le paddy ou riz paddy est le nom commun donné au grain de riz dans la forme où il se trouve à la récolte. A ce stade, il peut encore germer mais ne peut pas être consommé en l'état puisqu'il est pourvu d'une cuticule cellulosique (= les glumes), non comestibles, que l'on va détacher via le procédé mécanique du décorticage. On obtient alors du riz complet. Si la seconde enveloppe (= le péricarpe et le germe) est enlevé mécaniquement par abrasion (usinage), on obtient le riz blanchi ou "usiné". C'est sous cette forme qu'il est préférentiellement consommé¹.

Zones

- Méditerranéenne

“ Références bibliographiques

¹ Le Riz et la Camargue. Vers des agroécosystèmes durables. Cardère éditeur / Educagri éditions. 508pp, Mouret JC & Leclerc B, 2018.

²

³ Grain de riz, grain de vie. Paris, Quae/Magellan & Cie. 137pp, Jeanguyot M & Ahmadi N, 2002.

⁴ Fundamental of crop rice science. IRRI, Los Banos, 279 pp., Yoshida S, 1981., <https://books.irr.org/>[...]