

R Roses sauvages

Strate

Arbustive



manuel m.

v., Flickr

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Puceron de la pomme de terre - *Macrosiphum euphorbiae*
- - Parasitoïde oophage - *Anagrus atomus*

Hiver

Printemps

Été

Automne



Interactions

Consommation d'une partie des assimilats produits par la plante cultivée

• **Puceron de la pomme de terre** *Macrosiphum euphorbiae*

Saison	☼
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	● ●
	Risque fort concernant l'hébergement des ravageurs
Indice de fiabilité	★ ★ ☆ ☆
Références	¹ https://www6.inrae.fr/[...]

Endoparasitoïde

• **Parasitoïde oophage** *Anagrus atomus*

Saison	☼
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	● ● ● ●
	Ressource complémentaire / Habitat indispensable
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ☆
Références	¹ Leafhopper host plant associations for Anagrus parasitoids (Hymenoptera: Mymaridae) in the Okanagan Valley, British Columbia. J. Entomol. Soc. Brit. Columbia 104: 9-16., Lowery DT, Triapitsyn SV & Judd GJR, 2007.



IAE

- **Haie bocagère**
Période de floraison
Indice de fiabilité

