

## V Vipérine commune

### Origine

Eurasie

### Descr. plante adulte

Plante bisannuelle de 30-80 cm, verte, hérissée de poils raides, étalés, espacés, faiblement tuberculeux

- tige dressée, ordinairement très rameuse
- feuilles hispides, oblongues-lancéolées, les inférieures pétiolées, à 1 nervure, les autres sessiles, aiguës
- fleurs bleues ou violacées, assez grandes, en grappes formant une panicule oblongue généralement étroite
- calice hispide, à lobes linéaires, dressés
- corolle de 12-18 mm, à tube inclus dans le calice, à limbe élargi et irrégulier, 1-2 fois aussi longue que le calice
- étamines saillantes, à filets glabres
- carpelles de 2 mm, brièvement tuberculeux. Varie à étamines incluses, fleurs petites. <sup>1</sup>



Andreas Rockstein, Flickr

### Strate

Herbacée

### Cycle Biologique

Floraison: Mai-Août

 Quels agents biologiques favorise-elle ?

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*



## IAE

- **Jachère mellifère**

Période de floraison

Indice de fiabilité

Références



★ ★ ★ ★

<sup>1</sup> [https://www.apiculture.net/\[...\]](https://www.apiculture.net/[...])

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <https://www.tela-botanica.org/>[...]