

V Vipérine commune

Origine

Eurasie

Descr. plante adulte

Plante bisannuelle de 30-80 cm, verte, hérissée de poils raides, étalés, espacés, faiblement tuberculeux

- tige dressée, ordinairement très rameuse
- feuilles hispides, oblongues-lancéolées, les inférieures pétiolées, à 1 nervure, les autres sessiles, aiguës
- fleurs bleues ou violacées, assez grandes, en grappes formant une panicule oblongue généralement étroite
- calice hispide, à lobes linéaires, dressés
- corolle de 12-18 mm, à tube inclus dans le calice, à limbe élargi et irrégulier, 1-2 fois aussi longue que le calice
- étamines saillantes, à filets glabres
- carpelles de 2 mm, brièvement tuberculeux. Varie à étamines incluses, fleurs petites. ¹



Andreas Rockstein, Flickr

Strate

Herbacée

Cycle Biologique

Floraison: Mai-Août

 Quels agents biologiques favorise-elle ?

Hiver

Printemps

Été

Automne



IAE

- **Jachère mellifère**

Période de floraison

Indice de fiabilité

Références



★ ★ ★ ★

¹ [https://www.apiculture.net/...](https://www.apiculture.net/)

Références bibliographiques

¹ <https://www.tela-botanica.org/>[...]