

 Éviter l'implantation d'espèces hôtes dans la rotation

## Impacte

### Impact défavorable

- **Nématode à kystes de la betterave** *Heterodera schachtii*

Période de réalisation



Effet(s) direct(s)

Dans les situations où les parcelles sont infestées en nématodes, la culture du colza ou d'autres crucifères non nématicides en rotation avec la betterave doit être évitée. Dans tous les cas, il est impératif de bien gérer la culture de colza après la récolte (chaumes et repousses) en détruisant systématiquement les pivots et les repousses au minimum toutes les 4 semaines (cf. directive nitrates) ou toutes les 3 semaines sur les parcelles dont l'infestation est reconnue. Une destruction mécanique à l'aide d'un outil superficiel sera suffisante.

Indice de fiabilité

★ ★ ★ ☆

Références

<sup>1</sup> <https://www.itbfr.org/>[...]

- **Atomaire de la betterave** *Atomaria linearis*

Période de réalisation



Effet(s) indirect(s)

Éviter la proximité des champs implanté avec les cultures-hôtes l'année en cours ou l'année précédente telles que l'épinard, la betterave et le chanvre afin de limiter la multiplication des populations.

Indice de fiabilité

★ ★ ☆ ☆

Références

<sup>1</sup> <https://www.itbfr.org/>[...]