A Anaphes diana

Cycle Biologique

Dans la région de Montpellier, les adultes de P. lameerei peuvent être capturés d'avril à septembre en Europe centrale, mais on a pu montrer que cette espèce estive à l'état de larve avancée à l'intérieur des œufs de son hôte dans la région de Montpellier (France méridionale).[1]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

[InteractionsEtSaisons]

[SsnCulturesExplications]

[ConcerneZoneBioSuivante] :

	[Hiver]	[Printemps]	[Ete]	[Automne]
Sitone du pois *Sitona lineatus*		☆	☆	
Anaphes diana *Anaphes diana*				

[Ravageur.s] / *[Ennemi.s]* / ☆ *[INTERACTION]* / ★ *[INTERACTION FORTE]*

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Solagro
GOUVERNEMENT
ÉCOPHYTO RÉDUIRE ET AMÉLIORER L'UTILISATION DES PHYTOS
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
Fondation LÉA NATURE JARDIN BIO SOUS L'ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE
Fondation Rte Sous égide de la Fondation de France
Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

Régule

- **Sitone du pois** ***Sitona lineatus***

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Adulte ou Imago - du ravageur : Oeuf
Type trophique	Polyphage
Mode d'action	Consommation d'une partie des assimilats produits par la plante cultivée
Efficacité	MODEREE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	[1] The sitona species occuring on medicago and their natural enemies in the mediterranean region. Entomophoga n°25, pp 139-153., Aeschilmann JP, 1980., http://sci-hub.cc/[...] [2] Managing the Pea Leaf Weawil in the Field peas. Insect diseases. Prairies soil & crops journal. vol n°4, pp 83., Cárcamo H & Vankosky M, 1980., http://www.cabi.org/[...] [3] http://prairiesoilsandcrops.ca/[...]
Commentaires	Le mymaridae P. lameerei (micro-guêpe) est le seul parasitoïde d'oeuf important dans le sud-est de l'Europe. Il se peut qu'il soit spécialiste du genre Sitone. Il est responsable de 95% de l'ensemble des attaques d'œufs observés à travers l'Europe mais la mortalité due à ce parasitisme est en général assez faible et n'excède pas 20% en France.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Références bibliographiques

[1] The sitona species occuring on medicago and their natural enemies in the mediterranean region. Entomophoga n°25, pp 139-153., Aeschilmann JP, 1980., http://sci-hub.cc/[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité