B Belette d'Europe

La belette adulte mesure entre 14 et 30 cm et sa queue mesure 3-13 cm de long. Ce petit carnivore pèse entre 35 et 130 g lorsqu'il est adulte. Sa silhouette est longiligne et son corps est bas sur patte. Son pelage dorsal est brun-roux tandis que le ventral est blanc; elle possède une tâche brune sur la joue.[1]

Cycle Biologique

La Belette s'accouple en mars-avril et met bas après 35 jours de gestation. Le nombre de petits par portée varie de 2 à 10. il peut y avoir une seconde portée en juillet-août lorsque les proies sont abondantes. Les belettes sont matures sexuellement à l'âge de 3-4 mois. Elles vivent au maximum 3 ans.
Carnivore, elle s'alimente principalement de campagnols qu'elle peut aller chasser jusque dans leurs terriers. Elle est inféodée à la présence des Campagnols. [1]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

[InteractionsEtSaisons]

[SsnCulturesExplications]

[ConcerneZoneBioSuivante] :

	[Hiver]	[Printemps]	[Ete]	[Automne]
Campagnol terrestre ou Rat taupier *Arvicola terrestris*		☆	☆	
Belette d'Europe *Mustela nivalis*				

[Ravageur.s] / *[Ennemi.s]* / ☆ *[INTERACTION]* / ★ *[INTERACTION FORTE]*

[Leviersdaction] :

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

Régule

- **Campagnol terrestre ou Rat taupier** ***Arvicola terrestris***

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Adulte ou Imago - du ravageur : Adulte ou Imago
Type trophique	Polyphage
Mode d'action	Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante
Efficacité	MOYENNE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	[1] https://www.reperes-paysans.org/[...] [2] https://inpn.mnhn.fr/[...]
Commentaires	Une belette mange une centaine de campagnols par an. Carnivore, elle s'alimente principalement de campagnols qu'elle peut aller chasser jusque dans leurs terriers.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Impact du contexte paysager

Impact favorable

- **Zone boisée**
  Saison

  Effet(s) direct(s)
  Les zones boisés sont un refuge pour les carnivores et les parasites des rongeurs.
  Indice de fiabilité
  ★★★☆
  Références
  [1] Les rongeurs en verger de production biologique: méthodes de lutte préventive et continue. Courrier de l'environnement de l'INRA n°58., Miot S & Delattre P, 2010., http://www7.inra.fr/[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Références bibliographiques

[1] https://inpn.mnhn.fr/[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité