C Canne de Provence

Descr. plante adulte

Plante vivace de 2-5 mètres, glabrescente, à souche rampante tubéreuse. Tiges ligneuses, très épaisses, plus grosses que le doigt, non fragiles. Panicule longue de 40-60 cm, thyrsoïde-oblongue, dense, d'un vert blanchâtre ou violacé. Épillets longs d'environ 12 mm à 3-4 fleurs. Glumes presque égales, glabres, acuminées, égalant les fleurs. Glumelle trifide, à longs poils égalant les glumes.[1]

Shizhao, Wikimedia Commons

Strate

Herbacée

Type de feuillage

Feuilles très grandes, larges de 2-5 cm, lisses aux bords, offrante la base du limbe 2 oreillettes longues et la ligule très cou

pH sol

Plutôt basique

Cycle Biologique

Floraison de septembre à octobre

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde de puceron - Aphidius colemani
- - Parasitoïde de puceron - Aphidius colemani
- - Parasitoïde de puceron - Ephedrus persicae

Hiver
Printemps
Été
Automne

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Interactions

Parasitoïde

- **Parasitoïde de puceron *Aphidius colemani***
  - Saison
  - Rôle fonctionnel : Proies alternatives pour les larves
  - Note dépendance : ●●●
  - Ressource supplémentaire
  - Indice de fiabilité : ★★★☆
  - Références : [1] Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Edition Duong-Minh Nguyen, Ctifl., Ricard J-M, Garcin A, Jay M, Mandrin J-F, 2012.
  - Commentaires : Il s'agit d'une plante relais pour ce parasitoïde sur laquelle il trouve un hôte de substitution = Melanaphis donacis

- **Parasitoïde de puceron *Aphidius colemani***
  - Saison
  - Rôle fonctionnel : Abri et ressources nutritives
  - Note dépendance : ●●●
  - Ressource supplémentaire
  - Indice de fiabilité : ★★★☆
  - Références : [1] Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. 471p, Ricard et al., 2012

- **Parasitoïde de puceron *Ephedrus persicae***
  - Saison
  - Rôle fonctionnel : Abri et ressources nutritives
  - Note dépendance : ●●●
  - Ressource supplémentaire
  - Indice de fiabilité : ★★★☆
  - Références : [1] Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Edition Duong-Minh Nguyen, Ctifl., Ricard J-M, Garcin A, Jay M, Mandrin J-F, 2012.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Références bibliographiques

[1] http://www.tela-botanica.org/[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité