

E Eglantier ou rosier des chiens ou haies

Origine

Europe

Description plantule


Arbuste de 1 à 3m; tige arquées portant des aiguillons courbés. Feuilles pennées à folioles dentées. Faux-fruits (cynorrhodons) ovoïdes, glabres, rouges à maturité. Fleurs grandes, rose pâle, odorantes.¹

Strate

Arbustive

Cycle Biologique

Floraison: juin-juillet



Yoan

MARTIN, Wikimedia commons

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde oophage - *Anagrus atomus*
- - Carabe doré - *Carabus auratus*
- - Carabe noir des jardins - *Pterostichus melanarius*

Hiver

Printemps

Été


Automne



Interactions

Endoparasitoïde

- **Parasitoïde oophage *Anagrus atomus***

Saison	
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	●●●●●
	Ressource complémentaire / Habitat indispensable
Indice de fiabilité	★★★★★
Références	¹ La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp., Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011., http://www.lagalerieverte.com/ [...]
Commentaires	Il hiverne au stade embryonnaire ou larvaire sous la forme d'œufs de cicadelles parasités.

Prédateur

- **Carabe doré *Carabus auratus***

Saison	
Rôle fonctionnel	Zone refuge
Note dépendance	●●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	¹ Ground beetles (Carabidae) of field margin habitats. Biologia 75:1631-1641.» link=

- **Carabe noir des jardins *Pterostichus melanarius***

Saison	
Rôle fonctionnel	Zone refuge
Note dépendance	●●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	¹ Ground beetles (Carabidae) of field margin habitats. Biologia 75:1631-1641.» link=



IAE

- **Haie bocagère**
Période de floraison
Indice de fiabilité



“ Références bibliographiques

¹ *Guide des plantes médicinales*. Delachaux et Niestlé. p396., Schauenberg, P., Niestlé, V., 1974