I Insecticide

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Impacte

Impact défavorable

- **Bruche de la féverole** *Bruchus rufimanus*
  Période de réalisation
  Au STOCKAGE Appliquer du deltaméthrine + butoxyde de pipéronyle en nébulisation. Il est recommandé de laisser se "réchauffer" les grains afin que les bruches sortent de manière groupée pour plus d'efficacité. AU CHAMP SUR FÉVEROLE DANS L'OUEST Commencer le traitement à parti du début de la phase sensible, c'est-à-dire au stade jeunes gousses 2cm, si les températures dépassent les 20°C pendant au moins 2 jours. Renouveler le traitement si les féveroles son toujours sensibles et si les conditions climatiques sont toujours favorables au vol des bruches.Le produit recommandé est KARATE XPRESS à 0.125 kg/ha avec un volume d'eau d'au moins 150 l/ha.
  Effet(s) direct(s)
  AU STOCKAGE Agit par contact et ingestion rapidement sur les bruches adultes sorties des grains. Laisse des résidus sur les graines qui peuvent ne pas être acceptées par certains clients. Persistance d'action d'au moins 6 mois.

  AU CHAMP
  Indice de fiabilité
  ★★☆☆
  Références
  [1] Lutte contre la bruche de la féverole au stockage, Terres Univia, 2015., http://www.terresunivia.fr/[...]

  [2] Quoi de neuf protéagineux?, Arvalis, UNIP, 2012., http://www.arvalis-infos.fr/[...]

- **Syrphe porte-plume** *Sphaerophoria scripta*
  Période de réalisation
  Effet(s) direct(s)
  Toxicité des insecticides sur les larves présentes dans les colonies de pucerons
  Indice de fiabilité
  ★☆☆☆
  Références
  [1] https://www.arvalis-infos.fr/[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité