# Oeillet d'Inde

## Descr. plante adulte

L'oeillet d'Inde mesure 15 et 30 cm. Les feuilles sont sessiles et vert foncé. Les fleurs sont jaune, orange, rouge ou brun.

*Ömerulusoy, Wikimedia commons*

## Strate

Herbacée

## Type de feuillage

Persistant

## Cycle Biologique

La floraison s'étale du printemps aux premières gelées.

## Rapidité de croissance

Rapide

*Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés*

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Nématodes à galles - Meloidogyne spp.

*Hiver*
*Printemps*
*Été*
*Automne*

*Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés*

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

# Interactions

## Autres

- **Nématodes à galles** ***Meloidogyne spp.***

| | |
|---|---|
| Saison | |
| Rôle fonctionnel | Nocif |
| Note dépendance | ● |
| | Répulsif |
| Indice de fiabilité | ★★★☆ |
| Références | [1] https://www.annalsofrscb.ro/[...] |
| | [2] https://www.sciencedirect.com/[...] |
| | [3] https://www.supagro.fr/[...] |
| Commentaires | En introduisant une culture de Tagetes erecta ou de T. patula pendant 2 mois dans un assolement, à raison de 4 kg de semences /ha ou 20 plants au m2, on réduirait de près de 90% les populations de Meloidogyne spp à condition que la température soit supérieure à 15°C. En culture associée, l'espacement préconisé est de 2 mètres entre les rangs de tagètes ou encore de deux plants de tagètes pour six plants de tomate. |

*Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés*

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité