R Roses sauvages

Strate

Arbustive



manuel m. v., Flickr

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Puceron de la pomme de terre - Macrosiphum euphorbiae
- - Parasitoïde oophage - Anagrus atomus

Hiver
Printemps
Été
Automne

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Interactions

Consommation d'une partie des assimilats produits par la plante cultivée

- **Puceron de la pomme de terre** ***Macrosiphum euphorbiae***

Saison	❄
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	●●
	Risque fort concernant l'hébergement des ravageurs
Indice de fiabilité	★★☆☆
Références	[1] https://www6.inrae.fr/[...]

Endoparasitoïde

- **Parasitoïde oophage** ***Anagrus atomus***

Saison	❄
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	●●●●
	Ressource complémentaire / Habitat indispensable
Indice de fiabilité	★★★☆
Références	[1] Leafhopper host plant associations for Anagrus parasitoids (Hymenoptera: Mymaridae) in the Okanagan Valley, British Columbia. J. Entomol. Soc. Brit. Columbia 104: 9-16., Lowery DT, Triapitsyn SV & Judd GJR, 2007.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

IAE

- **Haie bocagère**
  Période de floraison
  Indice de fiabilité ☆☆☆☆

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité