Sureau noir

Strate

Arbustive

Type de feuillage

Caduque

Rapidité de croissance

Rapide

©Solagro, C. Gibert. Inflorescence de Sureau noir ou Grand sureau (Sambucus nigra).

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Syrphes - Syrphidae sp.
- - Parasitoïde de puceron - Binodoxys angelicae
- - Coccinelle à 2 points - Adalia bipunctata
- - Carabe doré - Carabus auratus
- - Carabe noir des jardins - Pterostichus melanarius

Hiver
Printemps
Été
Automne

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Interactions

Autres

- **Syrphes** ***Syrphidae sp.***

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressources nutritives
Note dépendance	●●●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★★★☆
Références	[1] https://arena-auximore.fr/[...]

Endoparasitoïde

- **Parasitoïde de puceron** ***Binodoxys angelicae***

Saison	
Rôle fonctionnel	Abri et ressources nutritives
Note dépendance	●●●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★★★☆
Références	[1] Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Edition Duong-Minh Nguyen, Ctifl., Ricard J-M, Garcin A, Jay M, Mandrin J-F, 2012.

Prédateur

- **Coccinelle à 2 points** ***Adalia bipunctata***

Saison	
Rôle fonctionnel	Proies alternatives pour les larves
Note dépendance	●●●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★★★☆
Références	Commentaires [1] Insectes du sureau, Didier , 2008, http://www7.inra.fr/[...]
Commentaires	Le Puceron noir du sureau est le principal ravageur du sureau. Il y effectue tout son cycle, hivernant sur les racines, sous forme d'œuf d'hiver. Au printemps, les adultes forment des manchons noirs sur les jeunes pousses. Ils sont souvent accompagnés de fourmis qui viennent profiter de leur miellat, leur assurant une protection en retour. Les adultes accumulent la sambunigrine contenue dans les stades jeunes des tiges, des feuilles et des fleurs, et qui les protègent naturellement de certains prédateurs comme la Coccinelle à sept points mais pas de tous : ainsi la Coccinelle à deux points, Coccinella bipunctata, est indifférente à cette toxine.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

SYNTHESE

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

- **Carabe doré** ***Carabus auratus***

Saison	
Rôle fonctionnel	Zone refuge
Note dépendance	●●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★☆
Références	[1] Ground beetles (Carabidae) of field margin habitats. Biologia 75:1631–1641.» link=

- **Carabe noir des jardins** ***Pterostichus melanarius***

Saison	
Rôle fonctionnel	Zone refuge
Note dépendance	●●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★☆
Références	[1] Ground beetles (Carabidae) of field margin habitats. Biologia 75:1631–1641.» link=

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

Galerie

Reproduction interdite

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité