Tanaisie commune

Origine

Eurasie

Description semence

akène

Descr. plante adulte

Gorremans J.L., 2012. Tanaisie commune (Tanacetum vulgare).

La tanaisie est une vivace à port dressé. Elle peut atteindre 1 m de haut. Les feuilles pennées sont vert foncé et très odorantes, ce qui permet de reconnaitre cette plante. Les fleurs sont sous forme de capitule jaune de 1 cm de diamètre, compact. Le capitule est semblable à une "boule" jaune. Sa tige est droite, simple, glabre. [1]

Strate

Herbacée

Type de feuillage

Les feuilles pennatiséquées sont alternes et souvent dentées sur le bord externe. Les caulinaires sont sessiles, demi-embrassant

pH sol

8

Cycle Biologique

La floraison s'étale de juillet à septembre.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Piéride du chou - Pieris brassicae
- - Mouche du chou - Delia radicum
- - Parasitoïde de la teigne des crucifères - Diadegma semiclausum
- - Aeolothrips - Aeolothrips intermedius
- - Coccinelle à 7 points - Coccinella septempunctata
- - Coccinelle des friches - Hippodamia variegata
- - Punaise prédatrice - Orius sp
- - Chrysope - Chrysopa sp
- - Chrysope - Chrysoperla sp

Hiver
Printemps
Été
Automne

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Interactions

Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

- **Piéride du chou** ***Pieris brassicae***

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	●● Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★☆☆
Commentaires	La tanaisie fleurit au mois de août, c'est à cette période qu'elle est répulsive.

- **Mouche du chou** ***Delia radicum***

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	● Répulsif
Indice de fiabilité	★★☆☆
Commentaires	La tanaisie fleurit au mois d'août, c'est à cette période qu'elle est répulsive.

Endoparasitoïde

- **Parasitoïde de la teigne des crucifères** ***Diadegma semiclausum***

Saison	
Rôle fonctionnel	Zone refuge
Note dépendance	●● Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★☆☆
Références	[1] Assessing the risks and benefits of flowering field edges: Strategic use of nectar sources to boost biological control. Thesis Wageningen University. 117 pp., Winkler K, 2005., http://edepot.wur.nl/[...]

Prédateur

- **Aeolothrips** ***Aeolothrips intermedius***

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Type de récompense florale	Pollen
Note dépendance	●●● Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★★★★
Références	[1] Protection des cultures de poireau contre les thrips : des plantes de service pour attirer les ennemis naturels. Infos Ctifl n°334. link=, Picault S, 2017

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

- **Coccinelle à 7 points** ***Coccinella septempunctata***

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Note dépendance	●●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★★
Références	[1] Protection des cultures de poireau contre les thrips : des plantes de service pour attirer les ennemis naturels. Infos Ctifl n°334, Picault S, 2017

- **Coccinelle des friches** ***Hippodamia variegata***

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Note dépendance	●●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★★
Références	[1] Protection des cultures de poireau contre les thrips : des plantes de service pour attirer les ennemis naturels. Infos Ctifl n°334, Picault S, 2017

- **Punaise prédatrice** ***Orius sp***

Saison	
Rôle fonctionnel	Abri et ressources nutritives
Note dépendance	●●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★★
Références	[1] Protection des cultures de poireau contre les thrips : des plantes de service pour attirer les ennemis naturels. Infos Ctifl n°334, Picault S, 2017

Prédateur (larve) et Pollinisateur (adulte)

- **Chrysope** ***Chrysopa sp***

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Type de récompense florale	Pollen
Note dépendance	●●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★★
Références	[1] Protection des cultures de poireau contre les thrips : des plantes de service pour attirer les ennemis naturels. Infos Ctifl n°334. link=, Picault S, 2017

- **Chrysope** ***Chrysoperla sp***

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Type de récompense florale	Pollen
Note dépendance	●●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★★
Références	[1] Protection des cultures de poireau contre les thrips : des plantes de service pour attirer les ennemis naturels. Infos Ctifl n°334. link=, Picault S, 2017

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

IAE

- **Patch**
  Période de floraison
  Indice de fiabilité ★★★★
  Références [1] Protection des cultures de poireau contre les thrips : des plantes de service pour attirer les ennemis naturels. Infos Ctifl n°334. link=, Picault S, 2017

- **Jachère fleurie**
  Période de floraison
  Indice de fiabilité ☆☆☆☆

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Références bibliographiques

[1] http://www.tela-botanica.org/[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité