

A Acarien des racines

Petit acarien de 0,5 à 0,8 mm de long au stade adulte, au corps ovale blanc brillant et aux pattes rougeâtres.

Cycle Biologique

Les différents stades peuvent se retrouver toute l'année. Les oeufs éclosent et laissent sortir des larves qui se nymphosent puis les adultes émergent.

Selon les conditions, de 45 à 108 jours sont nécessaires pour réaliser un cycle. ¹




Issu de: DOI:10.1590/1808-1657000692019, par Silva, Caetano, Carriço, Gazeta, Pinto. Vue ventrale de *Rhizoglyphus echinopus* (Acari: Acaridae)



Régule

• **Nématode des tiges et bulbes *Ditylenchus dipsaci***

Saison	
Stade de développement	- de l'ennemi : Ensemble du cycle - du ravageur : Adulte ou Imago
Mode d'action	Réduction du taux d'assimilation nette qui réduit la quantité d'assimilats produits par la plante cultivée, en réduisant la phot
Efficacité	MOYENNE
Indice de fiabilité	☆☆☆☆
Références	¹ The Acari, in Mites (Acari) for Pest Control, Blackwell publishing Oxford, UK., Gerson U, Smiley RL & Ochoa R, (eds) 2003.
Commentaires	A noter que cet acarien pourrait potentiellement causer des dégâts aux bulbes, mais cela semble peu observé. Des dégâts seraient peut-être à craindre en l'absence d'autres sources de nourriture pour cet acarien.

“ Références bibliographiques

¹ The bionomics of the bulb mite *Rhizoglyphus echinopus*, WEH Hodson