


A Acarien prédateur

Cet acarien prédateur a la forme d'une poire, il est de couleur jaune brillant et mesure 0,5 mm.
Son tube digestif se colore de rouge après consommation d'acariens rouges du pommier.



Ghazy & Suzuki, issu de
DOI:10.1371/journal.pone.0223929

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité



Régule

• **Tétranyque tisserand** *Tetranychus urticae*

Saison



Stade de développement

- de l'ennemi : Adulte
- du ravageur : Tous les stades

Type trophique

Polyphage

Mode d'action

Consommation d'une partie des assimilats produits par la plante cultivée

Efficacité

MODEREE

Indice de fiabilité

☆☆☆☆

Références

¹ [https://occitanie.chambre-agriculture.fr/\[...\]](https://occitanie.chambre-agriculture.fr/[...])

Commentaires

D'après un essai de l'APREL en 2012 dans les Bouches du Rhône des lâchers d'acariens prédateurs en sachets se sont révélés prometteurs : un apport précoce, dès la floraison mâle (3 semaines après plantation) à la dose de 1 sachet/4 plantes, a permis une bonne maîtrise des tétranyques pour un coût de (0.08 €/m²). Cette pratique sera à valider dans d'autres conditions de culture.