

A Autour des palombes

L'autour des palombes est un rapace diurne qui apprécie les régions boisées. On observe un dimorphisme entre les sexes. Le mâle est approximativement plus petit d'un tiers que la femelle, soit de la taille d'un épervier femelle. Le dessus du corps est gris sombre, le dessous blanchâtre avec de fines zébrures grises. Il présente un large sourcil blanc au-dessus de l'œil. Ce dernier est jaune pâle chez le jeune, et devient orange vif chez l'adulte âgé. Ses ailes sont larges et paraissent arrondies en vol (elles sont proportionnellement plus longues et plus pointues que celles de la femelle d'Épervier d'Europe). Il se différencie de la Buse variable par sa queue plus longue. Ses couvertures sous-caudales sont duveteuses et d'un blanc pur. La femelle est du même gabarit que la Buse variable : elle fait une fois et demi le poids du mâle. Sa description est sinon identique, mais en beaucoup plus terne. ^{1 2}



Cycle Biologique

La première nidification intervient à l'âge de 2 à 3 ans. La période de nidification a lieu entre mars à juillet. La femelle donne une seule couvée par an, de 3 à 4 œufs bleu pâle. Ils éclosent après une incubation de 35 à 42 jours. Le nid constitué de brindilles est construit par le couple près du tronc d'un grand arbre à une hauteur de 10 à 30 mètres, généralement en lisière de la forêt ou dans une clairière. La femelle couve seule et le mâle la nourrit pendant cette période. Les deux parents élèvent les jeunes durant six semaines environ. L'Autour des palombes s'installe parfois aussi dans un nid de pigeon ou de corvidé abandonné. Les jeunes prennent leur envol au bout de 45 jours. ¹

Conditions d'activités optimales

Ses proies de prédilection sont les oiseaux de toutes sortes y compris les rapaces de petite taille. Les pigeons sauvages et domestiques, les tourterelles constituent un menu privilégié. Étourneaux, grives, merles noirs, corneilles, geais sont également des proies appréciées. ³

Facteurs pédoclimatiques favorisant

Présent dans des milieux variés, il apprécie les espaces boisés.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité





Régule

• **Pigeon ramier** *Columba palumbus*

Saison



Stade de développement

- de l'ennemi : Adulte ou Imago
- du ravageur : Adulte ou Imago

Type trophique

Généraliste

Mode d'action

Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

Efficacité

MODEREE

Indice de fiabilité

☆☆☆☆

• **Corneille noire** *Corvus corone*

Saison



Stade de développement

- de l'ennemi : Adulte
- du ravageur : Adulte

Type trophique

Généraliste

Mode d'action

Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

Efficacité

MODEREE

Indice de fiabilité

☆☆☆☆

Références

¹ [https://www.oiseaux.net/\[...\]](https://www.oiseaux.net/[...])

Plantes hôtes

Site de nidification

- **Chêne vert** *Quercus ilex*

Saison

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références



Ressource supplémentaire



¹ [http://www.migraction.net/\[...\]](http://www.migraction.net/[...])

“ Références bibliographiques

- ¹ Oiseau libre, <http://oiseau-libre.net/>[...]
- ² Collin D & Le-Dantec D, 2001
- ³ Collin D & Le-Dantec D, 2001, <http://www.oiseaux.net/>[...]