

 France métropolitaine


 Pommier domestique *Malus pumila*

Le pommier domestique est originaire du Sud-Est de l'Asie.
Le pommier peut faire plus de 10 m de hauteur, les pommiers cultivés sont plus petits.
Ses feuilles caduques sont doublement dentées, ovales, alternes.
L'écorce varie du gris ou brun et peut être lisse ou écaillée selon les variétés.
Les fleurs sont roses et avec 5 pétales et 5 sépales.
L'inflorescence est composée de 5 à 6 fleurs.
La partie charnue de la pomme est un faux fruit qui s'est développé après la fécondation du réceptacle floral.



Gibert, Solagro. Pommes bicolores.

 Carpopapse des pommes et poires *Cydia pomonella*

 Ennemis naturels

Mésange bleu
Cyanistes caeruleus

Mésange charbonnière
Parus major

Chauves-souris Pipistrelles
Pipistrellus sp.

Parasitoïde du carpopapse
Ascogaster quadridentata

Parasitoïde du carpopapse
Pristomerus vulnerator

Forficules
Forficula auricularia & *Forficula pubescens*

 Plantes

Potentille arbustive
Potentilla fruticosa

Torilis des champs
Torilis arvensis

Achillée millefeuille
Achillea millefolium L.

Noisetier
Corylus avellana

Viorne tin
Viburnum tinus

Micocoulier
Celtis australis

Charme commun
Carpinus betulus

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Viorne lantane
Viburnum lantana

 IAE

Bande fleurie adjacente à une
parcelle cultivée

Haie bocagère

Jachère fleurie

Patch

Prairie fleurie

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Filets Alt'Carpo

Conduite Solaxe de l'arbre

Pose de niochirs

Conservation des arbres à cavités

Mélange fleuri projet Agath

Pose de diffuseurs à phéromones


Pose de gîtes à chauves-souris

Bande fleurie adaptée à la culture de
pêcher

Pose d'abris artificiels

Bande fleurie

 Acarien rouge *Panonychus ulmi*

 Ennemis naturels

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Plantes

Pas de correspondance en BD à ce jour

 IAE

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Filets Alt'Carpo

Conduite Solaxe de l'arbre

Pose de nichoirs

Conservation des arbres à cavités

Mélange fleuri projet Agath

Pose de diffuseurs à phéromones


Pose de gîtes à chauves-souris

Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Pose d'abris artificiels

Bande fleurie

 Puceron lanigère *Eriosoma lanigerum*

 Ennemis naturels

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Plantes

Pas de correspondance en BD à ce jour

 IAE

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Filets Alt'Carpo

Conduite Solaxe de l'arbre

Pose de nichoirs

Conservation des arbres à cavités

Mélange fleuri projet Agath

Pose de diffuseurs à phéromones

Pose de gîtes à chauves-souris

Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Pose d'abris artificiels

Bande fleurie