

## R Roses sauvages

### Strate

Arbustive



manuel m.

v., Flickr

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Puceron de la pomme de terre - *Macrosiphum euphorbiae*
- - Parasitoïde oophage - *Anagrus atomus*

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*



## Interactions

### Consommation d'une partie des assimilats produits par la plante cultivée

#### • **Puceron de la pomme de terre *Macrosiphum euphorbiae***

Saison	☼
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	● ●
	Risque fort concernant l'hébergement des ravageurs
Indice de fiabilité	★ ★ ☆ ☆
Références	<sup>1</sup> <a href="https://www6.inrae.fr/[...]">https://www6.inrae.fr/[...]</a>

### Endoparasitoïde

#### • **Parasitoïde oophage *Anagrus atomus***

Saison	☼
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	● ● ● ●
	Ressource complémentaire / Habitat indispensable
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ☆
Références	<sup>1</sup> Leafhopper host plant associations for Anagrus parasitoids (Hymenoptera: Mymaridae) in the Okanagan Valley, British Columbia. J. Entomol. Soc. Brit. Columbia 104: 9-16., Lowery DT, Triapitsyn SV & Judd GJR, 2007.



## IAE

- **Haie bocagère**  
Période de floraison  
Indice de fiabilité

